


87-451



ОБЪЕДИНЕННЫЙ  
ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДУБНА

P2-87-451

Л.С.Давтян\*, Г.С.Погосян\*, А.Н.Сисакян,  
В.М.Тер-Антонян\*

МЕХАНИЗМ  
ДВУКРАТНОГО ЛАУДОНОВСКОГО ВЫРОЖДЕНИЯ

Направлено в "Journal of Physics A:  
Letters to the Editor"

\* Ереванский государственный университет

1987

Почти тридцать лет назад Лаудоном<sup>1/</sup> на примере потенциала  $V(x) = -\alpha/|x|$  было опровергнуто встречающееся до сих пор в учебниках квантовой механики<sup>2/</sup> утверждение о невырожденности дискретного энергетического спектра одномерных квантовых систем. Открытый Лаудоном эффект недавно нашел математическое объяснение в рамках разработанной в<sup>3/</sup> теории скрытой симметрии одномерного атома водорода. В настоящей заметке предложено физически более естественное объяснение этому удивительному и красивому результату.

Суть нашего наблюдения сводится к использованию замены переменной

$$|x| = u^2, \quad (1)$$

которая приводит уравнение Шредингера для одномерного атома водорода к виду

$$\frac{d^2\psi}{du^2} - \frac{1}{u} \frac{d\psi}{du} + \delta(1+Eu^2)\psi = 0. \quad (2)$$

Здесь приняты атомные единицы ( $\mu = e = \hbar = 1$ ).

Для более высоких размерностей аналоги преобразования (1) довольно сложны и образуют класс так называемых небиективных квадратичных преобразований<sup>4/</sup>, интенсивно используемых в последние годы во многих задачах физики водородоподобных систем<sup>5-8/</sup>.

Отметим, что уравнение (2) отличается от уравнения Шредингера для одномерного гармонического осциллятора присутствием члена с первой производной. В случае более высоких размерностей пространства такого члена не возникает и водородная задача переходит в чисто осцилляторную. В этом отношении наличие в уравнении (2) первой производной – это специфика одномерия.


Следующий шаг в нашей схеме заключается в использовании подстановки

$$\psi = \sqrt{u} \varphi,$$

позволяющей ликвидировать в уравнении (2) член с первой производной.

Таким образом, преобразование (1) связывает одномерные задачи с потенциалами

$$V(x) = -1/|x|,$$



$$\tilde{V}(u) = \left(au - \frac{b}{u}\right)^2, \quad a = 2\sqrt{-E}, \quad b = \sqrt{3}/2\sqrt{2}.$$

При  $E < 0$  сказанное иллюстрируется рисунком.




Иллюстрация к механизму двухкратного лаудоновского выражения.

Мы видим, что ликвидация в (2) члена с первой производной порождает добавочное к осциллятору взаимодействие, имеющее сингулярный характер в начале координат. Это взаимодействие создает между двумя симметрично расположенными ямами непроницаемый барьер и тем самым выступает в качестве физической причины возникновения лаудоновских двухкратно вырожденных уровней энергии.

Мы благодарим С.И.Винницкого, Л.И.Пономарева, Л.Г.Мардояна и И.В.Луценко за полезные обсуждения

#### Литература

1. London R., Am. J. Phys., 27, 649-55, 1959.
2. Ландау Л.Д., Либшиц Е.М. Квантовая механика. "Наука", М., 1974.
3. Davtyan L.S., Pogosyan G.S., Sissakian A.N., Ter-Antonyan V.M. J.Phys., A 20, 1987.
4. Жевнаков К.Л., Слинько А.М., Шестаков И.П., Ширшов А.И. Колыца, близкие к ассоциативным. "Наука", М., 1978'
5. Kibler M., Negadi T., Croatica Chemica Acta, CCACAA 57(6), 1509, 1984.

6. Давтян Л.С., Мардоян Л.Г., Погосян Г.С., Сисакян А.Н., Тер-  
-Антонян В.М. Препринт ОИЯИ, Р2-86-393, Дубна, 1986.
7. Kibler M., Ronveaux A., Negadi T. J.Math.Phys. 27(6), 1986.
8. Давтян Л.С., Мардоян Л.Г., Погосян Г.С., Сисакян А.Н.,  
Тер-Антонян В.М. Препринт ОИЯИ, Р2-87-2II, Дубна, 1987.

Рукопись поступила в издательский отдел  
22 июня 1987 года.

Давтян Л.С. и др.  
Механизм двукратного лаудоновского  
вырождения

P2-87-451

Открытый Лаудоном эффект недавно нашел математическое объяснение в рамках теории скрытой симметрии одномерного атома водорода. В настоящей заметке предложено физически более естественное объяснение этому удивительному результату.

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1987

Перевод О.С.Виноградовой

Davtyan L.S. et al.  
Mechanism of the Laudon Double Degeneration

P2-87-451

The Laudon effect of double degeneration has been mathematically explained within the framework of theory of hidden symmetry of a one-dimensional hydrogen atom. In this note a more natural physical explanation of this surprising phenomenon is proposed.

The investigation has been performed at the Laboratory of Theoretical Physics, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1987

8 коп.

Редактор Б.Б.Колесова. Макет Р.Д.Фоминой.

Подписано в печать 14.07.87.

Формат 60x90/16. Офсетная печать. Уч.-изд.листов 0,5.

Тираж 490. Заказ 39354.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.  
Дубна Московской области.